

Сорта

Подбор сортов

При подборе сортов картофеля в условиях конкретной зоны целесообразно одновременно использовать 2-3 сорта с разной скороспелостью. НИИКХ рекомендуется для хозяйств картофельной специализации соотношение сортов, в % общей площади под картофелем: ранние и среднеранние сорта — 40%; среднеспелые сорта — 35%; среднепоздние — 25%. При таком соотношении сортов имеется возможность сместить сроки уборки на более ранний период (август) и проводить уборку основной массы картофеля при благоприятных условиях, снизив потери урожая и сохранив его качество.



Классификация

По назначению сорта картофеля подразделяются на:

- столовые, отличаются хорошими вкусовыми качествами, нетемнеющей мякотью и выровненной формой клубня;
- технические (заводские), имеют повышенное содержание крахмала;
- универсальные (столово-заводские), характеризуются хорошими вкусовыми качествами, выровненной формой клубней с нетемнеющей мякотью и повышенной крахмалистостью и содержанием белка.

Среди используемых сортов 60% приходится на столовые, 30% — универсальные и 10% — технические.

По срокам созревания сорта подразделяются на:

- ранние (50-65 дней);
- среднеранние (65-80 дней);
- среднеспелые (80-100 дней);
- среднепоздние (100-110 дней);
- поздние (более 110 дней).