

Ранние сорта

Ранний картофель позволяет снять урожай уже в июне, получив вкусные клубни с пониженным содержанием крахмала. Природные особенности Средневолжского региона перенесут без потерь только районированные сорта картофеля. Они испытаны и рекомендованы к выращиванию в личных хозяйствах. Сорт для Средневолжья в реестре не много, 68 сортов.

Средневожский регион: Пензенская область, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Самарская область, Ульяновская область.

Среди них не мало универсальных, популярных и весьма известных. Для него рекомендованы такие ранние сорта как Рубин, Розара, Самарский, Удача, Спринт. Есть и несколько новых: сорта Карузо и Людмила.

КАРУЗО. Срок раннего срока созревания, предназначен для производства чипсов. Кусты высокие, полураскидистые. Листья средне-волнистые по краям, зеленые, средней величины. Средняя урожайность сорта — 113-210 ц/га. Клубень овально-округлой формы, желтого цвета, глазки мелкие. Мякоть клубня желтая. Масса — 96-206 г. Крахмала — 17,4-20,2%. Вкус отличный. Товарность 71-92%. Лежкость 90%. Сорт показал устойчивость к возбудителям заболеваний картофеля: рак картофеля золотистая цистообразующая нематода фитофтороз скручивание листьев

Устойчивость к фитофторе листьев	Умеренно восприимчив
Устойчивость к фитофторе клубней	Умеренно устойчив
Устойчивость к раку картофеля	Устойчив
Устойчивость к парше	Умеренно устойчив
Нематода RoI	Устойчив
Устойчивость к вирусу Y	Устойчив
Устойчивость к вирусу L	Умеренно устойчив
Черная ножка	Устойчив



ЛЮДМИЛА. Сорт раннего срока созревания, столового назначения. Кусты среднерослые, полупрямостоячие. Листья крупные, темно-зеленые. Урожайность сорта 188-430 ц/га. Клубень желтый, удлиненной формы, глазки мелкие. Мякоть светло-желтого цвета. Масса клубня 111-280 г. Крахмал — 13,3-16,9%. Вкус отличный. Товарность 85-97%. Лежкость 94%. Сорт показал устойчивость к возбудителям заболеваний картофеля: рак картофеля, золотистая цистообразующая нематода . К фитофторозу устойчивость средняя.

Посадка

Клубни высаживают с первых дней мая. Глубина задела варьируется от 7 до 10 см.

Схема расположения клубней — 30 на 70 см.

Выращивание и уход

Сорт окучивают спустя 3 недели после прорастания, а также при длине ботвы 20-22 см. Поливы не нужны в период осадков, в засуху поливают до 3 раз: перед первой обработкой поверхности, накануне цветения и в разгар бутонизации. Для подкормок применяют азотные составы, минеральные смеси с фосфором и калием.